

TABLEAU DES COLLYRES

La manipulation des collyres n'est pas aisée lorsqu'elle n'est pas régulière... Ce tableau tente de regrouper les différents collyres que vous pourrez être amenés à utiliser. Ils sont regroupés par indication, les noms en DCI et quelques noms commerciaux sont détaillés, tout comme les mécanismes d'action, posologies et contre-indications.

Si vous découpez cette page pour la mettre dans votre blouse, nous ne vous en tiendrons pas rigueur !

Classe médicamenteuse	DCI	Nom commerciaux	Mécanisme d'action	Posologie habituelle	Durée du traitement	CI principales
COLLYRES HYPOTONISANTS : Glaucome et Hypertonie intraoculaire : prescription initiale par un ophtalmologiste						
Bêta-bloquants (BB)	Timoptol Cartéolol Bétaxolol	Timoptol, Nyogel, Timabak, Ophtim, Geltim LP, Cartéol, Betopic, Bétaxolol	Diminution de la sécrétion d'humeur aqueuse	1 goutte le matin pour les formes LP et 0,50 %, 1 goutte 2 fois par jour pour les autres	A vie	Asthme, BPCO, Insuffisance cardiaque décompensée, BAV 2 ^e ou 3 ^e degrés myasthénie, sd de Raynaud, bradycardie symptomatique ... (celles des BB)
Analogues des prostaglandines (PG)	Lantanoprost Travoprost Bimatoprost	Xalatan, Monoprost, ... Travatan Lumigan	Facilite l'élimination de l'humeur aqueuse	1 goutte le soir	A vie	Inflammation intraoculaire, Allergie, Infection en cours...
Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (IAC)	Brinzolamide Dorzolamide	Azopt Truzopt	Diminution de la sécrétion d'humeur aqueuse	1 goutte 2 fois par jour	A vie	Allergie Grossesse IR
Agoniste des récepteurs alpha2 adrénergiques (AA2)	Brimonidine Aproclonidine	Alphagan Iopidine	Facilite l'élimination de l'humeur aqueuse et diminue la sécrétion	1 goutte 2 fois par jour	A vie 2 semaines puis relais	Raynaud, maladie cardiovasculaires sévères non contrôlées ... Allergie
Parasympato-mimétiques	Pilocarpine	Pilocarpine 1 %	Facilite l'élimination de l'humeur aqueuse	1 goutte 3 fois par jour	Selon l'indication	Allergie
Collyres association (bithérapie)	BB + PG + IAC + AA2 IAC + AA2	Xalacom, Duotrav, Ganfort Cosopt, Cosidime Combigan Simbrinza	Facilite l'élimination de l'humeur aqueuse et diminue la sécrétion	1 goutte matin et soir	A vie	Cf ci-dessus
COLLYRES ANTIBIOTIQUES : Infection des paupières, de la cornée et de la surface oculaire (les posologies et durées de traitement sont des exemples pour un traitement de conjonctivites non compliquées)						
Aminoside	Tobramycine Néomycine	Tobrex Néo-mycine		1 goutte 4 x par jour	7 jours	Oto et néphrotoxicité Grossesse allaitement Allergie connue
Rifamycine	Rifamycine			1 goutte 4 x par jour	7 jours	Allergie connue
Fluoroquinolones	Ciprofloxacine Ofloxacine	Ciloxan Quinofree, Monoox		1 goutte 4 x par jour	7 jours	Grossesse, allaitement Allergie connue
Macrolides	Azytromycine	Azyter		1 goutte 2 x par jour	3 jours	Allergie connue

Classe médicamenteuse	DCI	Nom commerciaux	Mécanisme d'action	Posologie habituelle	Durée du traitement	CI principales
Serum physiologique	Lamabak, Larmes artificielles, Unilarmes		Lubrification de la surface oculaire	A volonté (lubrifiant = pas de principe actif pharmacologique) Les associations sont possibles	Pendant toute la durée des symptômes	Allergie connue a un des composants
Alcool polyvinylique et dérivés	Dulcilarme, Unifluid, Nutrivisc, Refresh, Fluidabak					
Méthyl-celluloses	Artelac, Celluvisc					
Carbomère	Lacryvisc, Lacryfluid, Gél-Larme, Siccafluid					
Gélatines	Systane					
Acide hyaluronique	Vismed, Hylovis, Neovis total, Hylocomod ...					
Emulsion lipidiques	Aquarest, Cationorm, Neovis Total, Viseo ...					
Osmoprotecteurs	Optive Fusion					
Tréhalose	Théalose					
COLLYRES ANTISEPTIQUES : conjonctivites ou infections suspectée de la surface oculaire						
Diamidines Amonium quaternaire	Héxamidine Céthéxonium bromure	Désoméline Biocidan	Antiseptique	En fonction de l'indication	En fonction de l'indication	Allergie connue
COLLYRES ANTIALLERGIQUES : conctivites allergiques						
Anti-H1	Lévocabastine Azelastine	Levophta, Lévofree Alergodil		1 goutte 2 fois par jour	Pendant toute la durée des symptômes	Enfant de moins de 3 ans
Antidégranulant mastocytaire	Cromoglycate de sodium Acide spaglumique	Cromédil, Opticron, Naabak		1 goutte 2 fois par jour	Toute la durée des symptômes	Grossesse Allaitement
Antidégranulant mastocytaire anti H1	Kétotifène	Zalerg, Monokéto		1 goutte 2 fois par jour	Toute la durée des symptômes	Allaitement
COLLYRES CONTENANT DES CORTICOIDES : prescription initiale par ophtalmologiste recommandée						
Corticoïde	Dexaméthasone Fluorométholone	Maxidex Dexafree Flucon	Puissance AI X26 Puissance AI X 1	En fonction de l'indication	En fonction de l'indication	Infection oculaire en cours, ulcère de cornée Hypertonie oculaire
Corticoïde + Antibiotique	Dexaméthasone + Oxytétracyclines + Tobramycine + Néomycine	Sterdex Tobradex Chibro-Cadron		En fonction de l'indication	En fonction de l'indication	Cf ci-dessus + Grossesse allaitement
COLLYRES CONTENANT DES AINS : prescription initiale par ophtalmologiste recommandée						
AINS	Kétorolac Indométacyne Flurbiprofène	Acular Indocollyre Oufen		Indications principales : péri-opératoires	En fonction de l'indication	Infection oculaire en cours, ulcère de cornée Allergie Grossesse Anticoagulants
LAVAGES OCULAIRES						
Antiseptique	Acide borique + borate de sodium	Dacudose Dacryum Dacryoserum Stéridose		Lavage à volonté	En fonction de l'indication	Allergie